

Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis

Cours reformulé · Démonstrations · Interprétations graphiques · Exercices

L'IDÉE ESSENTIELLE

De la tangente horizontale au lien entre *variation de la fonction* et *dérivée* : trois résultats fondamentaux pour étudier les fonctions.

01 Dérivée et extremum local

Une condition nécessaire pour un minimum ou un maximum local

THÉORÈME D'EXTREMUM LOCAL

Soit f une fonction dérivable en un point a situé **à l'intérieur de son domaine de définition**. Si f admet un extremum local en a , alors

$$f'(a) = 0.$$

ATTENTION À LA RÉCIPROQUE

La condition $f'(a) = 0$ ne suffit pas à garantir un extremum. Par exemple, pour $f(x) = x^3$, on a $f'(0) = 0$, mais 0 n'est ni un maximum ni un minimum local.

02 Le théorème de Rolle

Une tangente horizontale entre deux points de même hauteur

THÉORÈME DE ROLLE

Soient $a < b$ et f une fonction telle que :

1. f est continue sur $[a, b]$;
2. f est dérivable sur $]a, b[$;
3. $f(a) = f(b)$.

Alors il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ vérifiant

$$f'(c) = 0.$$

Pourquoi? La courbe part d'une hauteur $f(a)$ et y revient en b . Sous ces hypothèses, elle possède au moins une tangente horizontale entre les deux points.

02 Le théorème de Rolle

Démonstration, portée du résultat et rôle des hypothèses

DÉMONSTRATION

Puisque f est continue sur le segment $[a, b]$, elle y atteint un minimum m et un maximum M .

Premier cas : si $m = M$, alors f est constante sur $[a, b]$. Par conséquent, $f'(x) = 0$ pour tout $x \in]a, b[$.

Second cas : si $m < M$, au moins l'une des valeurs extrêmes m ou M diffère de $f(a) = f(b)$. L'extremum correspondant est donc atteint en un point c strictement compris entre a et b . La fonction étant dérivable en c , le théorème de Fermat donne $f'(c) = 0$. **CQFD.**

Remarques importantes

1. **Le point c peut ne pas être unique.** Avec $f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, on a $f(-\sqrt{3}) = f(\sqrt{3}) = 0$, tandis que $f'(-1) = f'(1) = 0$.
2. **Rolle garantit une existence, pas une formule pour c .** Il faut souvent résoudre $f'(x) = 0$ pour le déterminer.
3. **La continuité aux bornes est indispensable.** Pour $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ sur $[0, 1]$, on a $f(0) = f(1) = 0$ et $f'(x) = 1$ pour $0 < x < 1$. Mais f est discontinue en 1 : la conclusion échoue.
4. **La dérivabilité à l'intérieur est indispensable.** Pour $f(x) = |x|$ sur $[-1, 1]$, on a $f(-1) = f(1) = 1$ et f est continue, mais non dérivable en 0. Sa dérivée ne s'annule nulle part où elle existe dans $] -1, 1[$.

EXERCICE D'APPLICATION

Montrer que l'équation

$$6x^5 - 27x^2 + 18x - 1 = 0$$

admet au moins une solution dans l'intervalle $]0, 1[$. Indication : étudier le signe du polynôme en quelques points de $[0, 1]$, puis utiliser la continuité.

POINT MÉTHODE

Avant d'appliquer Rolle, vérifier *séparément* les trois hypothèses : continuité, dérivabilité et égalité des valeurs aux extrémités.

03 Le théorème des accroissements finis

TAF — aussi appelé théorème de Lagrange

ÉNONCÉ

Soient $a < b$ et f une fonction **continue sur** $[a, b]$ et **dérivable sur** $]a, b[$. Alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que

$$\boxed{f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}} \iff \boxed{f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)}.$$

Démonstration. Construisons la fonction auxiliaire

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$


Elle est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$. Or

$$\varphi'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

La relation annoncée en découle. **CQFD.**

Interprétation graphique

La droite sécante (AB) , où $A(a, f(a))$ et $B(b, f(b))$, a pour coefficient directeur $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Le TAF affirme qu'il existe au moins une **tangente à la courbe parallèle à cette sécante**.



À RETENIR

Le théorème de Rolle est un cas particulier du TAF : lorsque $f(a) = f(b)$, la pente de la sécante vaut zéro.

EXERCICE — APPLIQUER LE TAF

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 12$ sur $[1, 4]$. Montrer qu'il existe $c \in]1, 4[$ tel que $f(4) - f(1) = 3f'(c)$, puis déterminer c .

04 Inégalités des accroissements finis

Encadrer une variation à l'aide des valeurs de la dérivée

ENCADREMENT PAR DEUX CONSTANTES

Supposons f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $a < b$. S'il existe deux réels $m \leq M$ tels que

$$m \leq f'(x) \leq M \quad \text{pour tout } x \in]a, b[,$$

alors

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

Démonstration. Le TAF fournit $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$. Comme $m \leq f'(c) \leq M$ et $b-a > 0$, il suffit de multiplier l'encadrement par $b-a$. **CQFD.**

VERSION EN VALEUR ABSOLUE

Soit f dérivable sur un intervalle I . Si, pour un réel $M \geq 0$,

$$|f'(x)| \leq M \quad \text{pour tout } x \in I,$$

alors, pour tous $a, b \in I$,

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b-a|.$$

Démonstration. Si $a = b$, l'inégalité est immédiate. Si $a < b$, le résultat précédent appliqué avec $m = -M$ donne

$$-M(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

Cela équivaut à $|f(b) - f(a)| \leq M(b-a)$. Si $b < a$, on échange les rôles de a et b . **CQFD.**

CONSÉQUENCE — FONCTION LIPSCHITZIENNE

Une fonction dont la dérivée est majorée en valeur absolue par M sur un intervalle alors sa variation est au plus M fois la distance entre les points.

EXERCICES D'APPLICATION

1. Pour tous réels a, b , établir :

$$|\cos b - \cos a| \leq |b-a|, \quad |\sin b - \sin a| \leq |b-a|.$$

2. Pour $0 \leq a < b$, démontrer :

$$\frac{b-a}{1+b^2} \leq \arctan(b) - \arctan(a) \leq \frac{b-a}{1+a^2}.$$

05 Conséquences pour les fonctions

Constante, monotonie et stricte monotonie

DÉRIVÉE NULLE ET FONCTION CONSTANTE

Si une fonction f est dérivable sur un intervalle I et si

$$f'(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in I,$$

alors f est **constante** sur I .

Démonstration. Pour $a, b \in I$, le TAF (ou l'inégalité des accroissements finis avec $M = 0$) entraîne $f(b) - f(a) = 0$. Ainsi, $f(a) = f(b)$. **CQFD.**

SIGNE DE LA DÉRIVÉE ET VARIATIONS

Soit f dérivable sur un intervalle I . Alors :

- f est **croissante** sur I si et seulement si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$;
- f est **décroissante** sur I si et seulement si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

Idée de démonstration. Lorsque $f'(x) \geq 0$, le TAF donne, pour $a < b$, $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \geq 0$. La réciproque suit de la définition de la dérivée comme limite de taux de variation de même signe.

NE PAS CONFONDRE : CROISSANTE / STRICTEMENT CROISSANTE

Une condition **suffisante** pour que f soit strictement croissante est $f'(x) > 0$ sur I . Il suffit même que $f'(x) \geq 0$ partout et que les zéros de f' soient en nombre fini ou dénombrable : sur aucun sous-intervalle non trivial la fonction ne peut être constante. De même, une dérivée ≤ 0 , dont les zéros sont au plus dénombrables, assure la stricte décroissance.

EXEMPLE COMMENTÉ

Considérons $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $[0, 2]$. On calcule

$$f'(x) = 3x(x - 2).$$

Pour $0 < x < 2$, on a $f'(x) < 0$, tandis que $f'(0) = f'(2) = 0$. La fonction est donc **strictement décroissante** sur $[0, 2]$, malgré l'annulation de sa dérivée aux bornes.

Bilan. Rolle fournit une tangente horizontale ; le TAF relie une variation à une dérivée ; ses inégalités permettent de contrôler les variations.